

◆予防接種の種類と接種年齢◆

※桜井市では下記の要領で予防接種を実施しています。

対象疾病 (ワクチン)	予防接種対象者	
ロタウイルス ワクチン	ロタリックス (1価)	生後6週～生後24週まで 4週間以上の間隔をあけて2回接種
	ロタテック (5価)	生後6週～生後32週まで 4週間以上の間隔をあけて3回接種
B型肝炎 ワクチン	生後2か月～1歳未満 4週間以上の間隔をあけて2回接種 3回目は1回目接種から20週以上あけて接種 (生後2か月から9か月までに完了するのが望ましい)	
小児用 肺炎球菌 ワクチン	生後2か月～5歳未満 接種開始年齢で接種回数が異なります。 【生後2か月～7か月未満】 初回 4週間以上の間隔をあけて3回接種 追加 1歳以降で、初回3回目接種終了後60日以上の間隔をあけて1回接種 【生後7か月～1歳未満】 初回 4週間以上の間隔をあけて2回接種 追加 1歳以降で、初回2回目接種終了後60日以上の間隔をあけて1回接種 【1歳～2歳未満】 60日以上の間隔をあけて2回接種 【2歳～5歳未満】 1回接種	
5種混合 ワクチン ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ ヒブ	初回接種	生後2か月～7歳6か月未満 3週間以上の間隔をあけて3回接種 (生後2か月～7か月未満までに完了するのが望ましい)
	追加接種	初回接種終了後から6か月から18か月までの間隔を置いて1回接種 (7歳6か月未満までに)
BCGワクチン	生後5か月～8か月未満の間に1回接種(1歳未満までは接種可能)	
麻しん風しん混合 (MR)ワクチン	第1期	1歳～2歳未満の間に1回接種
	第2期	小学校就学前の1年間の間に1回接種
水痘ワクチン	初回	1歳～3歳未満 1回接種(1歳～1歳3か月までに完了するのが望ましい)
	追加	初回接種終了後3か月以上の間隔をあけて1回接種 (初回接種終了後6か月～12か月までの間隔をあけることが望ましい)
日本脳炎ワクチン	第1期初回	3歳～7歳6か月未満 (1週間以上の間隔をあけて2回接種)
	第1期追加	第1期初回2回目接種終了後1年後に1回接種 (7歳6か月未満までに)
	第2期	9歳～13歳未満で1回接種
二種混合ワクチン	第2期	11歳～13歳未満で1回接種
HPVワクチン (子宮頸がん)	サーバリックス (2価)	小学校6年生～高校1年生の女子(3回接種) 1回目接種終了後1か月以上の間隔をあけて2回目接種 1回目接種終了後6か月以上かつ2回目の接種終了後2か月半以上の間隔をあけて3回目接種
		小学校6年生～高校1年生の女子(3回接種) 1回目接種終了後2か月以上の間隔をあけて2回目接種 1回目接種終了後6か月以上(2回目接種終了後3か月以上)の間隔をあけて3回目接種
	シルガード (9価)	小学校6年生～高校1年生の女子 1回目の接種を15歳未満で受ける場合(2回接種) : 1回目接種後5か月以上(通常6か月以上)の間隔をあけて2回目接種 ※2回目を5か月未満で接種した場合、2回目接種終了後3か月以上の間隔をあけて3回目の接種が必要
		1回目の接種を15歳以上で受ける場合(3回接種) : 1回目接種終了後2か月以上の間隔をあけて2回目接種 1回目接種終了後6か月以上(2回目接種終了後3か月以上)の間隔をあけて3回目接種

※ 接種年齢等は予防接種法に基づいて実施しています。法律が改正された場合は上記接種年齢等が変更になる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。

※ 予防接種には、思いがけない事故が起こることがありますので、予防接種の間隔等には十分注意して受けてください。